

Краткие экофаунистические заметки

С.К. Корб, Д.А. Пожогин (г. Нижний Новгород)

О поимке билатерального гинандроморфа *Trichiura crataegi* (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae) в Нижегородской области

S.K. Korb, D.A. Pozhogin. On the capture of bilateral gynandromorph of *Trichiura crataegi* (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae) in the Nizhny Novgorod Province.

12 сентября 2010 г. во время ночного лова насекомых на свет лампы ДРВ-250 в окрестностях д. Сырхватово Борского р-на Нижегородской области (56°27'40.6'' с. ш., 44°01'49.9'' в.д.) был пойман билатеральный гинандроморф *Trichiura crataegi* (Linnaeus, 1758). Левая сторона бабочки соответствует самцу, правая — самке, что особенно хорошо заметно по строению антенн (Рис. 1). *T. crataegi* обладает умеренно выраженным половым диморфизмом в рисунке крыльев и их форме: у самца на переднем крыле имеется четкая срединная перевязь, более темная, чем основной фон крыла, само же крыло заостренно-треугольное. Такая перевязь у самки либо не выражена вовсе, либо выражена очень слабо, крыло при этом более вытянутое. Помимо этого, самки крупнее и всегда несут волосяную подушечку на вершине брюшка. Гениталии данного экземпляра не исследованы.

Для *T. crataegi* известно еще 2 случая гинандроморфизма [Schulz, 1904], причем в обоих случаях правая сторона соответствовала самцу, левая — самке.

Литература. Schulz O. 1904. Gynandromorphe (hermaphroditische) Macrolepidopteren der palaearktischen Fauna IV // Berl. ent. Z. Bd. 48. S. 71–119.




Рис. 1. *Trichiura crataegi* (Linnaeus, 1758), билатеральный гинандроморф